CY 10 1l- INSECTICID, ACARICID, CONCENTRAT LICHID, pentru uz profesional şi populație, pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare.

UFI: 2850-T0NT-E005-0AJY

COMPOZIȚIE 100 grame deprodus conțin:

Cipermetrină (CAS 52315-07-8; CE 257-842-9) 10 g (10%)

Coformulanți până la 100 g **ATENȚIE**

FRAZE DE PERICOL: H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sistem nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P273 Evitați dispersarea în mediu. P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

PRODUCĂTOR: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italia- Tel +39 049/9337111

DISTRIBUITOR: FLOVY PROD COM S.R.L. – Cluj-Napoca, Romania,Tel/Fax 0264/274118, 0745/191328

Aviz Ministerul Sănătății NR. 3400BIO/18/06.23

Lot nr./din: vezi pe ambalaj. Perioada de valabilitate: 3 ani de la data fabricației.

DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE: CY 10 este un insecticid concentrat lichid, cu spectru larg de combatere, cu efect rezidual şi acțiune imediată asuprainsectelor zburătoare și târâtoare. Formula conține o cantitate mare de Cipermetrină, care este un piretroidfoto-stabil ce acționează prin ingestie și contact, asupra celulelor sistemului nervos central și periferic al insectelor, cauzând un blocaj de transmitere al impulsurilor nervoase, paralizie și moarte. Emulsia obținută este uniformă și stabilă. Dacă tratamentul este făcut într-un mediu închis sau în zone umbrite, efectul durează câteva săptămâni.

Produsul poate fi aplicat cu ajutorul pompelor de stropire, echipamentelor ULV sau termo-nebulizatoarelor. Domeniile de utilizare pentru CY10 sunt insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode.**CY10** este eficient în controlul insectelor zburătoare (muște, viespi, țânțari comuni și țânțari tigru, muște de nisip și musculițe), împotriva insectelor târâtoare (gândaci de bucătărie, furnici, păianjeni, purici, ploșnițe) și împotriva insectelor invadatoare de depozite (molii, gărgărițele de grâu și gândaci făină).

DOZE RECOMANDATE: Încondițiile de utilizareprodusul CY10 demonstrează o bună putere de knockdown şi bună mortalitate după 24 de ore,*Aedes albopictus, Phlebotomus papatasi, Musca domestica, Nezaraviridula, Blattaorientalis,Sitophilus Granarius, Tribolium spp., Lasiusniger,*

purici*(Ctenocephalydes spp.), Płodiainterpunctella,* păianjeni*(Pholcus spp.), Polistes Gallicus, Dermatophagofagoides spp.*Nu s-au constat diferențe, înceea ce priveşte eficiența după 21 de zile de la primul tratament, ceea ce demonstrează bună putere reziduală.

Pentru utilizarea în interiorul clădirilor, zonele exterioare sau zonele cu vegetație, aplicat cu ajutorul pompelor cu presiune, electrice sau motorizate sau atomizoare, produsul poate fi diluat astfel:

- În controlul țânțarilor (*Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles*, etc.): se diluează 5 – 10 ml într-un 1l de apă;
- În controlul muștelor și altor insecte zburătoare: se diluează 10 – 20 ml într-un 1l de apă;
- În controlul insectelor târâtoare: se diluează 20 – 30 ml într-un 1l de apă.

Se recomandă creșterea dozajului în cazul unor infestări majore sau în prezența insectelor rezistente.1 litru soluție este efficient pentru tratarea unei suprafețe de 15-25 m^2.În cazul suprafețelor absorbante, cum ar fi pereții poroși, se utilizează o cantitate mai mare de soluție.Dacă utilizați un echipament ULV (volum ultra redus): se diluează până la 2-3 % în apă sau în glicol, utilizând 1 litru de soluție pentru a trata o suprafață de 2500 m^3sau 1000 m^2.Dacă utilizați un echipament cu ceață caldă (pulverizatoare termice): se diluează 2-3 % în glycol sau apă, iar pentru interior folosiți 0,8 -1 litru soluție pentru 2000 m^3.

ATENȚIE! MANIPULAȚI CU GRIJĂ PRODUSUL: A nu se contamina alimente și băuturi sau recipiente destinate păstrării lor în timpul utilizării. Evitați inhalarea prin pulverizare și spălați-vă pe mâini în cazul în care aveți lichid insecticid pe ele. Nu se utilizează în formă concentrată: urmați instrucțiunile producătorului. Nu pulverizați produsul în aer. A nu se folosi direct pe animale. Nu folosiți în agricultură. Țineți animalele departe în timpul tratamentului. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

INFORMAȚII PENTRU MEDICI : Acțiunea farmacodinamică a Cipermetrinei ca ingredient activ: blochează transmiterea impulsurilor nervoase. Atenție:Consultați un centru de toxicologieîn caz de otrăvire.

Telefon de urgență: 021 318 3606 (Luni-Vineri: 8:00- 15:00); Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3, București - 050463.

AGIȚAȚI BINE ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE COMERCIALIZA DOAR ÎN AMBALAJUL ORIGINAL. NU REUTILIZAȚI AMBALAJUL.